Deux nouveaux Hétéromères de la République Argentine

par M. Pic.

Les deux espèces décrites ici, communiquées par Mr. C. Bruch (et que je possède également) ont été recueillies par le Dr. A. Ogloblin à Loreto Gob. de Misiones.

Mordella Ogloblini n. sp. Elongata, postice attenuata, parum nitida griseo-holosericeo pubescens, nigra elytris in disco refescentibus, signaturis griseis aut luteis ornata. Capite lato fere uniformiter griseo pubescens; articulo ultimo palparum non breve, oblongo-subovato; antennis sat brevibus articulis 2 - 4 elongatis, 5.° et sequentibus intus subdentatis, ultimis brevibus; thorace robusto, breve et lato; griseo-luteo marginato, antice transverse unilineato et medio longitudinaliter bilineato; scutello minuto; elytris thorace paulo angustatis, postice attenuatis, apice subrotundatis, ad scutellum reducte griseolineatis, in disco antice et ad suturam medio griseo-luteo maculatis, ante apicem luteo et reducte arcuate-fasciatis; pectore et abdomine lateraliter luteo maculatis et medio diverse griseo pubescentibus; pygidio ad basim luteo notato, elongato; pedibus nigris, pubescentibus, tibiis anticis curvatis.

Long. (cum pygidio) 10 mill.

Voisin de *M. quadrisignata* Chevr., s'en distingue par les dessins des élytres un peu différents et le pygidium marqué de jaune à la base.

Copidita Ogloblini n. sp. Elongata, parum nitida, nigra, capite rufo maculato thorace rufo, postice medio nigro notato, elytris testaceis, in disco ad suturam nigro piceo vittatis, apice nigris, margine externa nigra, pedibus pro parte testaceis Antennis nigris, parum elongatis, articulo ultimo bipartito; capite nigro inter antennis rufo notato, in vertice fortiter et dense punctato, oculis parum prominulis; thorace sat breve, ad medium dilatato, medio supra biimpresso, fortiter et dense ruguloso-punctato, ad basim fere biplicato; elytris

thorace sat latioribus, subparallelis, apice breve attenuatis, dense ruguloso-punctatis, breve griseo pubescentibus; pedibus nigris, diverse testaceo notatis.

Long. 6 mill.

Très voisin de *C. argentina* Pic, en diffère surtout, en plus de la coloration élytrale, par le prothorax autrement impressionné.